HOMOGENEIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra que enviamos a Nutex Lab debe ser:

- **Homogénea**
- **Representativa del material original**

1- ¿Cómo hacemos?

Tomar las muestras y submuestras.


Extender el contenido de todas las submuestras sobre una superficie LIMPIA y mezclar a mano.


Homogeneizar, mezclando apropiadamente todo el material.


Distribuir el material en forma pareja sobre la superficie.


Dividir el material sobre la superficie en cuatro partes iguales.

Mezclar las dos partes restantes y repetir la operación hasta conseguir una muestra del tamaño adecuado.

A tener en cuenta...

- Definir el **sistema de muestreo, la unidad de muestreo y la altura de corte, antes** de muestrear.
- Dividir en sectores **homogéneos**, tratando de **evitar agrupas más de 10 has** en una sola muestra.
- **Evitar tomar submuestras** en las cercanías de alambrados, bebederos, caminos, sectores de carga de equipos, etc.
- Acompañar el muestreo de una **descripción fenológica del cultivo**, lo más exacto posible.

NUTEX Nutrition ® Experience

¿Cómo tomar una muestra de...

pastura y verdeo?

1-

Recorrer el terreno en zig-zag tomando una muestra representativa en intervalos fijos y distribuir la toma de submuestras uniformemente a lo largo de toda la superficie a muestrear.

2-

Colocar la muestra en una bolsa plástica.

3-

Homogeneizar y reducir (250 g MS o 1500 g de materia húmeda).

5-

Identificar la muestra y colocarla dentro de una bolsa plástica cerrada herméticamente.

4-

Conservar la muestra en la heladera (0-5°C) y remitir al laboratorio tan pronto como sea posible.